

8°  
CONGRESSO  
NAZIONALE

Auditorium  
OSCAR NIEMEYER



Ravello (SA)

23 - 25 maggio  
2013

PROGRAMMA CONGRESSUALE

**UrOP**  Urologi Ospedalità Gestione Privata

09.30 - 12.00

Presidente: **A. Russo**

Moderatori: **S. Di Nicola - A. Loreto - C. Nardi**

## ELENCO COMUNICAZIONI

### ANDROLOGIA

- 1. UTILIZZO PROTESI PENIENA IDRAULICA AMS CX CON MOMENTARY SQUEEZE IN UN CASO COMPLESSO DOPO ESPIANTO DI DUE PREGRESSI IMPIANTI PROTESICI**  
P. Vicini , G. Antonini, V. Gentile
- 2. CORPOROPLASTICA CON TUTORE ASSIALE SOFFICE DI PICCOLO CALIBRO, INCISIONE UNICA DELLA TONACA ALBUGINEA E GRAFTING DI SAFENA. ACCORGIMENTI DI TECNICA E FOLLOW-UP A TRE E SEI ANNI IN UNO STUDIO MULTICENTRICO**  
M. Silvani, S. Pecoraro, A. Zucchi
- 3. FRATTURA DEL PENE: ACCESSO PENO-SCROTALE CON DEGLOVING COMPLETO DELL'ASTA DOPO VALUTAZIONE RMN**  
G. Antonini, E. De Berardinis , M. Von Heland, R. Giovannone, GM. Busetto, E. Casciani, V. Gentile
- 4. STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO SULLA TECNICA CHIRURGICA SEC. PAULO EGYDIO NELLA MALATTIA DI LA PEYRONIE CON FOLLOW UP A 48 MESI**  
M. Silvani, R. Leonardi, R. Giulianelli, L. Mavilla, S. Sansalone, A. Verbena, A. Zucchi, L. Gallo, S. Brunori, R. Fede, R. Giannella, M.C. Gambardella, S. Pecoraro
- 5. DIVERTICOLO URETRALE CONSEGUENTE AD ESPIANTO DI SFINTERE ARTIFICIALE**  
M. Schettini, G. Mirabile, L. Albanesi, F. Attisani, B.C. Gentile, L. Mavilla, F. Pisanti, G. Vincenti, R. Giulianelli
- 6. EFFICACIA DEL COMPLESSO LEPIDIUM MEYENII + BETA-ECDYSTERONE (LEPIJET CPR) AD USO QUOTIDIANO, ASSOCIATO A TERAPIA SOTTO DOSATA CON IPDE5 NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEFICIT ERETTILE (CASI CLINICI)**  
L. Gallo

### IPB

- 1. ONE DAY SURGERY IN THE TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC ENLARGEMENT WITH THULIUM LASER: A SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE**  
L. Carmignani, S. Picozzi, A. Macchi, S. Casellato, G. Bozzini, S. Maruccia, C. Marengi
- 2. SAFETY AND EFFICACY OF TURIS-VAPORIZATION WITH GYRUS PK (TURIS-V) IN MEN ON ANTICOAGULANT DRUGS: RUA'S EXPERIENCE**  
R. Giulianelli, L. Albanesi, F. Attisani, B.C. Gentile, L. Mavilla, G. Mirabile, F. Pisanti, M. Schettini, T. Shestani, G. Vincenti
- 3. A PROSPECTIVE EVALUATION OF 200 PATIENTS UNDERGOING THULEP FROM JANUARY 2012 UNTIL APRIL 2013 AT OUR INSTITUTION**  
L. Carmignani, S. Picozzi, A. Macchi, S. Casellato, G. Bozzini, S. Maruccia, C. Marengi

## STUDIO MULTICENTRICO ITALIANO SULLA TECNICA CHIRURGICA SEC. PAULO EGYDIO NELLA MALATTIA DI LA PEYRONIE CON FOLLOW UP A 48 MESI

M. Silvani\*, R. Leonardi\*\*, R. Giulianelli \*\*\*, L. Mavilla\*\*\*, S. Sansalone \*\*\*\*, A. Verbena\*\*\*\*\*, A. Zucchi \*\*\*\*\*, L. Gallo ^, S. Brunori ^^^, R. Fede ^^, R. Giannella ^^, M.C. Gambardella ^^, S. Pecoraro ^^

^^Alta Specialità Nefro-Uro-Andrologia Clinica Malzoni, Avellino

^ Fondazione Pascale-Istituto Nazionale dei Tumori, Napoli - ^^^ Villa Tiberia, Roma

\* Ospedale degli Infermi, Biella (TO) - \*\* Casa di Cura Musumeci Gecas, Gravina di Catania (CT)

\*\*\* Casa di Cura Villa Claudia, Roma - \*\*\*\* Dip.Urologia, Università Tor Vergata, Roma

\*\*\*\*\* Ospedale di Locri (RC) - \*\*\*\*\* Dip. Urologia ed Andrologia, Università Perugia

### SCOPO DEL LAVORO:

Si riporta esperienza policentrica sulla tecnica di corporoplastica di raddrizzamento geometrica secondo PAULO EGYDIO in pazienti (pz) affetti da Malattia di La Peyronie(PD). Obiettivo di questo studio è la valutazione dei risultati morfofunzionali con follow up a 36 mesi.

### MATERIALI E METODI

Arruolati 117 pz da Gennaio 2004 a Dicembre 2010 provenienti da 9 centri italiani. I criteri di arruolamento sono stati: recurvatum>60° con media di 75° ( range 60°-90°) con impossibilità coitale tutti affetti da PD con placca stabilizzata da 6-12 mesi; attività erettile di base conservata con IIEF-5 di 22 (range20-24); rigidità preoperatoria valutata con NPT test, Ecocolordoppler dinamico (10-20 mcg Alprostadil); età media 55±11anni (range 29-70); followup a 36 mesi (controlli seriati a 3-6-12-18-24-36mesi) è stato eseguito con anamnesi sessuale, IIEF-5 e per le partner la compilazione di questionario di soddisfazione sessuale. Tutti i centri hanno utilizzato la tecnica chirurgica geometrica di Egydio ed innesto unico in matrice di collagene di pericardio bovino. Tutti i pz nel postoperatorio hanno praticato fisioterapia con inibitori PDE-5 al fine di evitare fibrosclerosi cicatriziali dell'innesto.

### RISULTATI

Complicanze: intraoperatoria nessuna; postoperatoria ematomi nel 15% dei casi, ipoestesia glandulare nel 5%. La durata dell'intervento è stata in media di 2h 30m ( range 90-180min). La lunghezza del pene è stata incrementata di 2,5cm (range 1.5 – 3.5 cm); curvatura residua nel 17% dei pz con angolo max di circa 15° che non ha impedito la penetrazione e nessun caso è stato sottoposto a re-intervento. Al followup a 12 mesi tutti i pz hanno evidenziato una normale attività sessuale ed il 30% di essi usa inibitori PDE-5; a 24 mesi l'uso degli inibitori PDE-5 ha subito un lieve incremento (32%) mentre a 36 mesi l'uso ha raggiunto il 38%. La soddisfazione sessuale nelle partners è stata definita: accettabile nel 1%, buona nel 39%, molto buona nel 50% ed eccellente nel 10% al followup di 12mesi; a 24 mesi è stata accettabile nel 5%, buona nel 35%, molto buona nel 52% ed eccellente nel 8% mentre a 36 mesi accettabile nel 5%, buona nel 45% molto buona nel 46% ed eccellente nel 4%.

### DISCUSSIONE

La tecnica di Egydio è basata su principi geometrici con unica incisione della tunica albuginea ed è applicabile su tutti i tipi di curvatura peniene acquisite da PD; indispensabile sono i criteri di selezione e la tipologia dell'innesto, infatti la matrice di collagene di pericardio bovino rimodellandosi al tessuto ospite crea una completa restitutio ad integrum dell'albuginea.

### MESSAGGIO CONCLUSIVO

Il vantaggio è la notevole percentuale di incremento della lunghezza e diametro penieno con bassa percentuale di complicanze ed elevati tassi di soddisfazione sessuale; lo svantaggio è di essere una tecnica complessa con una curva di apprendimento di medio alto grado.